


## Bệnh hại sầu riêng mùa mưa

Sầu riêng là loại trái cây mà giúp mang lại được hiệu quả kinh tế tốt. Sầu riêng cũng rất khó và không thể chịu được những điều kiện khắc nghiệt như hạn, mặn, ngập úng,... do vậy sầu riêng chỉ phát triển với đa phần vùng nước ngọt quanh năm và bị [bệnh hại sầu riêng](#) rất nhiều. Ngoài ra nó bị nhiều các loại sâu bệnh tấn công nhất là trong mùa mưa hiện nay. Hiện nay các nơi bị nhiễm **bệnh thán thư** và bệnh chát bị chết ngọn và ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng và phát triển của cây, cho ra năng suất giảm.



[Bệnh thán thư](#) là một loại bệnh phổ biến trên cây sầu riêng và nó do nấm *Colletotrichum zibethinum* gây ra. Nấm bệnh phá hoại chủ yếu là trên lá Vết bệnh tạo ra chấy màu đỏ, trên đó có những hạt nhỏ màu đen li ti nó chính là các ổ bào tử. Giữ vết bệnh và phần xanh còn lại của đường ranh giới rõ rệt màu nâu. Bệnh phát sinh trên lá già và là bán tế. Bệnh khi nặng thì toàn bộ lá sẽ rụng sớm, cây kém phát triển hơn nhất là khi cây con nhỏ. Nấm tồn tại trên lá do những ngày mưa dầm và có nhiệt độ khá cao, ẩm độ không khí cao. Vườn trồng dày, thiếu chăm sóc cũng là điều kiện thuận lợi để bệnh phát triển.



Ngoài ra thì mùa mưa bệnh cháy lá khá phổ biến và gây hại trên các vườn sầu riêng, Bệnh do nấm *Rhizoctonia solani* gây ra, nấm tấn công và gây hại không chỉ cây con trong vườn ươm mà còn gây hại cả trên cây lớn, bất kỳ ở vị trí nào trên lá thì bệnh lan dần từ lá già bên dưới và lên trên lá non. Vết bệch không có hình dạng rõ rệt, màu xanh tái như bị luộc nước sôi, về sau thì nó lan rộng lại, bệnh lây lan rất nhanh từ lá này sang lá khác các bệnh dính lại với nhau như kiến làm tổ (nhiều người hay gọi rằng là bệnh tổ kiến) bên trong có những sợi nấm trắng xám và đôi khi có những hạch nấm tròn màu nâu nhạt như hạt cát. Nếu mà bệnh xảy ra trong lúc có độ ẩm độ không khí cao, hoặc mưa dầm thì vết bệch có màu đen và nhũn ra. Khi bệnh nặng sẽ làm lá cháy thành mảng lớn và rụng sớm hơn, đôi khi cành non cũng bị tấn công nhiều làm khô dần và chết ngọn. Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện mưa nhiều, nóng và ẩm. Hạch nấm có thể sống trong đất và trong nước hàng năm, từ đó mọc ra sợi nấm để xâm nhập và gây bệnh.





*Triệu chứng bệnh cháy lá chết ngọn  
trong vườn ươm.*

## **Những biện pháp phòng đối với bệnh thán thư và bệnh cháy lá chết ngọn.**

- + Đối với những vườn mới trồng nên trồng với một mật độ hợp lý nhất, khoảng cách 8-10m, sẽ tạo thuận lợi cho cây sâu riêng phát triển thông thoáng hơn.
- + Vệ sinh vườn cây, tỉa bớt cành lá gần mặt đất, thu gom những bộ phận bệnh đem tiêu hủy nó.
- + Vườn cây cần cao ráo, thoát nước tốt trong những mùa mưa.
- + Bón phân cân đối, tránh những phân bón thừa đạm.
- + Đối với vườn ươm sâu riêng, không bố trí vườn ươm hay đặt cây con dưới tán cây lớn, ít nắng và ẩm thấp, không tưới quá nhiều nước nhất là vào chiều tối.

## Thông tin liên quan



[Sâu hại trên măng cầu](#)





[Bệnh lem lép hạt lúa](#)



[Bệnh Bọ trĩ Hoa hồng và cách khắc phục](#)





[Làm thế nào trị nhện đỏ cho mau khỏi bệnh](#)