

Bệnh lem lép hạt lúa và thuốc trị bệnh lem lép hạt lúa

Trong thực tế sản xuất lúa, **[bệnh lem lép hạt](#)** thường xuyên xảy ra trên đồng, và xảy ra trong tất cả các vụ lúa.

Bệnh có xu thế ngày càng tăng lên trong điều kiện thâm canh lúa hiện nay, đã làm ảnh hưởng lớn đến năng suất và đặc biệt làm giảm đáng kể chất lượng lúa gạo của Việt Nam.



Triệu chứng và tác nhân gây bệnh:

Bệnh lem lép hạt lúa là tên gọi của hiện tượng hạt lúa bị lửng hoặc lép, bên trong đó gạo rất ít, hoặc lép thì bên trong hoàn toàn không có gạo. Khi hạt lúa bị lửng và lép, có thể kèm theo triệu chứng vỏ hạt lúa và hạt gạo bị đổi màu tùy theo tác nhân gây ra.



Lem lép hoàn toàn do nấm

[Bệnh lem lép hạt](#) lúa do nhiều tác nhân gây ra trong giai đoạn lúa trổ bông:

* Do những yếu tố môi trường:

- Thiếu dinh dưỡng như: thiếu các nguyên tố đa, trung và vi lượng, đất bị chua phèn.
- Do thiếu nước, nhất là lúc trổ.
- Bị mưa to, gió lớn lúc trổ.
- Bị sốc nhiệt độ (nóng quá hoặc lạnh quá) lúc trổ.

* Do các loài dịch hại gây ra dưới đây:

- Cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng và nước.
- Do các loài vi khuẩn gây hại.
- Do các loài nấm bệnh.
- Do nhện gié và các côn trùng gây ra.



Điều kiện thích hợp cho bệnh phát sinh phát triển:

Đối với yếu tố dinh dưỡng thì có thể xảy ra ở tất cả các vụ trong năm. Còn lại tùy theo mùa vụ mà các tác nhân gây lem lép hạt sẽ khác nhau.

Vụ Hè Thu, nếu bị mưa to, gió lớn, nắng nóng lúc trổ bông, thời tiết nóng ẩm vụ Hè Thu cũng rất thích hợp cho các loài vi khuẩn như bạc lá, các nấm như khô vằn, và nhện gié phát triển gây hại nặng...

Vụ Đông Xuân, nếu ruộng bị bón dư phân đạm, lại gieo sạ dày, thời tiết âm u, ít nắng, đêm có sương mù nhiều và se lạnh thì thường bị các loài nấm bệnh như đạo ôn gây hại nặng...

Biện pháp phòng trừ:

Để phòng trừ lem lép hạt lúa, cần áp dụng tổng hợp các biện pháp sau:

- Chọn giống lúa kháng sâu, bệnh.
- Xử lý hạt giống trước khi trồng.
- Thau chua rửa mặn, khử độc hữu cơ cho đất.
- Gieo cấy đúng thời vụ, với mật độ thích hợp.
- Bón phân đầy đủ và cân đối, cung cấp thêm các loại trung, vi lượng.
- Phòng trừ tốt các loại côn trùng, nhện và bệnh hại. Trong thực tế, tác nhân chính gây lem lép hạt trên lúa

là do các loài vi sinh vật và nhện gié gây hại. Vì vậy, khi điều kiện thời tiết thích hợp cho bệnh hại và nhện gié phát triển thì phun phòng ngừa một trong các loại thuốc sau vào giai đoạn trước trổ và sau khi trổ đều

Thuốc trị bệnh lem lép hạt lúa

BVTV Thiên Bình chia sẻ đến bà con các loại thuốc trị bệnh lem lép hạt lúa hiệu quả nhất hiện nay

Amtivo 750WG



Quy cách: gói 14g

THÀNH PHẦN:

Tebuconazole 500g/kg

Trifloxystrobin ... 250g/kg

Phụ gia 250g/kg

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- Là thuốc trừ bệnh phổ rộng công nghệ mới, nội hấp, lưu dẫn, trừ được nhiều loại bệnh xuất hiện

cùng một lúc, ức chế quá trình sinh tổng hợp của các tế bào nấm bệnh. Thuốc đăng ký đặc trị hiệu quả bệnh đốm lá trên hồ tiêu.

- Được sản xuất bởi nhà máy tốt nhất trên thế giới về thuốc trừ bệnh. Với liều lượng tăng hơn 40% so với loại thông thường. Đã tốt nay còn tốt hơn; yên tâm tuyệt đối khỏi lo bệnh đạo ôn cổ bông, đạo ôn lá, đạo ôn cổ lá.
- Đặc trị: **đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn trên lúa.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn .	14g/ bình 25 lít. Phun 2 bình cho 1.000m ² .
Rau màu: Cà Chua, Ớt, Dưa Hấu, Bắp Cải, Hoa Cúc, Dâu Tây, Cây họ đậu, ...	Rỉ sắt, thán thư, đốm lá, phấn trắng, đốm vòng, ...	40g/ 100 lít nước, phun ướt đều tán lá cây.
Cây ăn quả: Xoài, Thanh Long, Sầu Riêng, Bưởi, Nho, Điều, Cam, Quýt, Vải, Mãng Cầu, ...	Thán thư, cháy lá, đốm đen quả, rỉ sắt, đốm vòng, thối quả, ...	80g/ 1 phuy 200 lít. Phun ướt đều tán lá cây.

- Thời gian cách ly an toàn: 07 ngày trước khi thu hoạch.

AMYLA TOP 325SC



Quy cách: chai 200ml, 240ml

THÀNH PHẦN:

Azoxystrobin ... 200g/l

Difenoconazole 125g/l

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG

Lúa

DỊCH HẠI

Lem lép hạt

LIỀU LƯỢNG

Pha 15-20ml/ bình 25 lít.

Liều lượng: 0,3-0,5 lít/ha.

Lượng nước: 400-500 lít/ha.

Đổm vằn

Chuối Thán thư, giữ bộ lá xanh tốt

Mít Sơ đen múi mít, thối quả

Sầu Riêng Thán thư bông, thối quả, khô bông

Rau Mầu Thán thư, chết cây con

Xoài Thán thư, phấn trắng

Thời gian cách ly: 07 ngày.

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHHT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Web: www.bvtvthienbinh.com

Link Fanpage: <https://www.facebook.com/THIEN-BINH-102656208736169>

Thông tin liên quan



[BỘ TRÍ GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

THIBIDES[®]
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái



LIÊN HỆ NGAY  Email info@bvtvthienbinh.com  Hotline **0898.999.929**

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu công nghệ cao
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

**THAM SÀU LƯU ĐÃN,
CHUYÊN VI MẠNH,
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,
KHÔ TRI ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: C22-02, KOC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.com

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline
0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)