

# **Bệnh thán thư và bệnh đốm đen gây hại bông trái non cây xoài, thuốc trị bệnh thán thư và bệnh đốm hại bông xoài**

Đối với cây xoài, giai đoạn ra bông, đậu trái có thể được xem là giai đoạn cực trọng của cả chu kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, trong giai đoạn này cũng thường xuất hiện nhiều loại bệnh hại quan trọng, nếu phòng trị không đúng và không kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và sản lượng về sau. Hai bệnh hại quan trọng và khó phòng trị nhất trong giai đoạn này chính là bệnh Thán thư do nấm và Đốm đen do vi khuẩn. Trong khi bệnh Thán thư do nấm bà con đã biết từ lâu và có nhiều kinh nghiệm phòng trừ nhưng đối với bệnh Đốm đen do vi khuẩn thì có lẽ còn xa lạ với nhiều bà con nông dân vì triệu chứng trên bông rất khó phân biệt với bệnh Thán thư và cũng mới xuất hiện gần đây.

## **1. Tác nhân gây [bệnh thán thư bông xoài](#):**

Bệnh Thán thư: do nấm *Colletotrichum gloeosporioides* gây ra.

Bệnh Đốm đen: do vi khuẩn *Xanthomonas campestris* pv. gây ra.

## **2. Cách nhận biết bệnh thán thư và đốm đen vi khuẩn trên bông xoài:**

Đối với **bệnh Thán thư**, vết bệnh là các đốm nhỏ hình góc cạnh không đều, màu đen và xuất hiện với mật độ dày đặc. Các đốm bệnh liên kết lại với nhau thành đám màu nâu đen rồi dần dần lớn lên khiến cho hoa không nở và không thụ phấn được. Vết bệnh thán thư thường khô và không ăn lan vào các gié bên trong.



Bệnh thán thư bông xoài

Đối với bệnh Đốm đen do vi khuẩn vết bệnh cũng màu đen nhưng hơi sũng ướt, vết bệnh ăn lan vào trong các gié và cành hoa. Toàn bộ phát hoa bị bệnh có triệu chứng co rút lại.



[Bệnh đốm đen bông xoài](#)

### 3. Điều kiện phát sinh, phát triển

Đối với bệnh thán thư bông xoài: Nhiệt độ và độ ẩm là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phát sinh và phát triển của bệnh. Nếu ẩm độ cao trên 85% và nhiệt độ tương đối thấp dưới 25% là điều kiện lý tưởng cho bệnh phát triển. Sương mù đóng vai trò quan trọng làm tăng tỷ lệ bệnh thán thư trên vườn xoài. Bào tử nấm *Colletotrichum gloeosporioides* có sẵn từ các bộ phận đã nhiễm bệnh trên cây xoài hoặc trên các tàn dư trong vườn gặp điều kiện thuận lợi dễ dàng nảy mầm và theo đường nước tưới hoặc nước mưa để phát tán mầm bệnh. Trên các bộ phận non của cây, bào tử tạo ra giác bám xâm nhập qua lớp biểu bì và phân tán trong mô gây ra các vết bệnh màu đen và nhanh chóng phát triển.

Đối với bệnh đốm đen do vi khuẩn: Vi khuẩn *Xanthomonas campestris* pv. có thể tồn tại 8 tháng trên các mô sống của cây, chúng theo nước mưa hoặc nước tưới lây lan từ cây này sang cây khác bằng nhiều cách. Chúng xâm nhập vào bên trong mô cây thông qua các vết chích của côn trùng hay các vết thương trong quá trình chăm sóc như làm cỏ, bón phân, cắt cành tạo tán... Ẩm độ cao, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển.

#### 4. [Thuốc trị bệnh thán thư hại bông xoài](#)

**THIBIPES** chia sẻ đến bà con nhà nông các loại thuốc đặc trị bệnh thán thư hại bông xoài và bệnh đốm đen hại xoài sau đây:

### Amtivo 750WG



**Quy cách:** gói 14g

**THÀNH PHẦN:**

Tebuconazole .... 500g/kg

Trifloxystrobin ... 250g/kg

Phụ gia ..... 250g/kg

### **ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:**

- Là thuốc trừ bệnh phổ rộng công nghệ mới, nội hấp, lưu dẫn, trừ được nhiều loại bệnh xuất hiện cùng một lúc, ức chế quá trình sinh tổng hợp của các tế bào nấm bệnh. Thuốc đăng ký đặc trị hiệu quả bệnh đốm lá trên hồ tiêu.
- Được sản xuất bởi nhà máy tốt nhất trên thế giới về thuốc trừ bệnh. Với liều lượng tăng hơn 40% so với loại thông thường. Đã tốt nay còn tốt hơn; yên tâm tuyệt đối khỏi lo bệnh đạo ôn cổ bông, đạo ôn lá, đạo ôn cổ lá.
- Đặc trị: **đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn trên lúa.**

### **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

#### **CÂY TRỒNG**

#### **BỆNH HẠI**

#### **LIỀU LƯỢNG**

Lúa

Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn .

14g/ bình 25 lít. Phun 2 bình cho 1.000m<sup>2</sup>.

Rau màu: Cà Chua, Ớt, Dưa Hấu, Bắp Cải, Hoa Cúc, Dâu Tây, Cây họ đậu, ...

Rỉ sắt, thán thư, đốm lá, phấn trắng, đốm vòng, ...

40g/ 100 lít nước, phun ướt đều tán lá cây.

Cây ăn quả: Xoài, Thanh Long, Sầu Riêng, Bưởi, Nho, Đìêu, Cam, Quýt, Vải, Mãng Cầu, ...

Thán thư, cháy lá, đốm đen quả, rỉ sắt, 80g/ 1 phuy 200 lít.

Phun ướt đều tán lá cây.

Thời gian cách ly an toàn: 07 ngày trước khi thu hoạch.

## **AMICOL 360EC**



**Quy cách:** chai 240ml

**THÀNH PHẦN:**

Difenoconazole ... 155g/l

Propiconazole ..... 155g/l

Tebuconazole ..... 50g/l

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

**CÂY TRỒNG**

Lúa

Chuối

**DỊCH HẠI**

Lem lép hạt.

Đốm vằn.

Thán thư, tạo phấn trái.

**LIỀU LƯỢNG**

Pha 20ml/ bình 25 lít.

Pha 10-12ml/ bình 20 lít.

Chai 240ml pha cho 2 phuy 200 lít.

Mít

Sơ đen múi mít, thối quả.

Liều lượng: 0,3-0,5 lít/ ha. Lượng nước  
400-500 lít/ ha.

Cây ăn trái: Sầu Riêng, Xoài,  
Mãng Cầu.

Thán thư, khô đen bông,  
bóng đẹp trái.

Thời gian cách ly: 07 ngày.

Rau màu: Ớt, Cà Chua, Bắp Cải, Thán thư (đốm mắt cua).  
Dâu Tây, Hoa Hồng, ...

## AMYLA TOP 325SC



**Quy cách:** chai 200ml, 240ml

**THÀNH PHẦN:**

Azoxystrobin ... 200g/l

Difenoconazole 125g/l

### **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

<b>CÂY TRỒNG</b>	<b>DỊCH HẠI</b>	<b>LIỀU LƯỢNG</b>
Lúa	Lem lép hạt Đốm vằn	Pha 15-20ml/ bình 25 lít. Liều lượng: 0,3-0,5 lít/ha.
Chuối	Thán thư, giữ bộ lá xanh tốt	Lượng nước: 400-500 lít/ha.
Mít	Sơ đen múi mít, thối quả	
Sầu Riêng	Thán thư bông, thối quả, khô bông	
Rau Mâu	Thán thư, chết cây con	
Xoài	Thán thư, phấn trắng	

Thời gian cách ly: 07 ngày.

### **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.**

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHHT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com)

Web: [www.bvtvthienbinh.com](http://www.bvtvthienbinh.com)

Link Fanpage: <https://www.facebook.com/THIEN-BINH-102656208736169>

## Thông tin liên quan



[BỘ TRƯỞNG GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)



**THIBIPES**  
Đồng hành cùng phát triển

# NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY

Email: [info@bvtvthienbinh.com](mailto:info@bvtvthienbinh.com)

Hotline: 0898.999.929

The advertisement features a background of durian fruit and leaves. It includes four circular inset images showing different types of plant damage: a leaf with necrotic spots, a stem with a hole, a stem with longitudinal cracks, and a durian fruit with a dark, sunken lesion. A cartoon chicken is positioned in the bottom right corner.

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

**Bọ trĩ** **Muỗi hành**

**Rầy nâu** **Sâu đục thân**

**ĐẶC TRỊ!**

**Rầy phấn trắng**

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) Hotline: **0898.999.929**

**THIBIDES**  
Hàng đầu Việt Nam  
**TB DIETRAY**  
**NEW**  
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

**THAM SÂU LƯU ĐÃN  
CHUYÊN VI MẠNH  
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG  
KHÔ TRI ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**  
Địa chỉ: C22-02, KCC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929  
Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) - Website: [www.thienbinh.com](http://www.thienbinh.com)

**BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA**

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

**3** LOẠI BỆNH  
PHỔ BIẾN  
THƯỜNG GẶP  
**TRÊN ỚT CHUÔNG**

Liên hệ ngay



Website  
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline  
**0898.999.929**

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)