

# Bệnh thối trái sầu riêng và thuốc trị bệnh thối trái sầu riêng

Sầu riêng là loại cây trồng đặc biệt của vùng nhiệt đới. Nó có mùi vị đặc trưng riêng biệt mà không phải ai cũng yêu thích được. Bên cạnh đó sầu riêng mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Tuy nhiên hiện nay sầu riêng đang phải đối mặt với rất nhiều loại bệnh hại đặc biệt là bệnh thối trái, khiến cho năng suất chất lượng trái giảm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. Chính vì vậy hãy chủ động ngăn ngừa bệnh thối trái trên cây sầu riêng để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bệnh gây ra.

## 1. Biểu hiện của [bệnh thối trái trên sầu riêng](#)

Thối trái là bệnh nguy hiểm, nó không chỉ gây hại ở phần quả mà còn gây hại đến nhiều bộ phận trên cây sầu riêng.

Trên thân cây: Khi nấm bệnh tấn công, trên thân cây xuất hiện đốm sậm màu, hơi ướt. Sau đó, vết bệnh chuyển màu nâu đỏ, vỏ bị nứt và chảy ứa ra các giọt nhựa trong vàng, phần gỗ tại vết bệnh cũng hóa nâu.

Trên lá: Bệnh tấn công trên lá làm cháy lá, lá vàng héo và rụng dần. Đôi khi bệnh còn gây hại trên các cành cao phía trên.

Trên trái: Nấm gây hại trên trái, làm trái bị thối hàng loạt. Bệnh thường xuất hiện ở phần đít trái, ban đầu là những đốm nhỏ màu nâu đen, sau đó lan rộng ra và có màu xám đen. Bệnh phát triển thành từng lốm lan rộng và ăn sâu vào thịt trái, khiến thịt trái bị nhũn thối có mùi hôi chua, khó chịu. Trời ẩm thấp, trên vết bệnh hình thành những tơ nấm trắng. Bệnh làm trái nhỏ, chín sớm, bệnh nặng làm thối cả trái và lây lan sang những trái khác. Bệnh gây hại trong mọi giai đoạn của trái, kể cả trái sau thu hoạch.



Bệnh thối quả sầu riêng

## 2. Nguyên nhân gây bệnh thối trái sầu riêng

Để có những biện pháp phòng trừ bệnh phù hợp, hiệu quả thì cần hiểu rõ về nguyên nhân gây ra bệnh.

Bệnh thối trái trên cây sầu riêng do nấm *Phytophthora palmivora* gây ra.

Bệnh thối trái xuất hiện nhiều vào mùa mưa hoặc khi có nhiều sương mù và nhiệt độ môi trường của vườn sầu riêng thấp, thoát nước kém tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát triển gây hại.

Vườn cây ẩm thấp, rậm rạp không thông thoáng, không cắt tỉa thường xuyên chính là điều kiện để các bào tử nấm phát sinh mạnh mẽ trên diện rộng.



### **3. Biện pháp phòng trừ:**

- + Đối với vườn mới trồng nên trồng với mật độ thấp, khoảng cách 8-10m, tạo thuận lợi cho cây sầu riêng phát triển thông thoáng.
- + Vệ sinh vườn cây, tỉa bớt cành lá gần mặt đất, thu gom những trái bệnh đem tiêu hủy.
- + Vườn cây cần cao ráo, thoát nước tốt trong mùa mưa.
- + Phủ gốc bằng rơm khô hay cỏ khô, không phủ bằng xơ dừa
- + Bao trái là biện pháp hiệu quả để hạn chế bệnh thối trái hiệu quả.
- + Bón cân đối NPK.
- + Bón phân chuồng hoai mục ( tốt nhất là sử dụng phần gà) kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học Trico để hạn chế bệnh phát triển.
- + Dùng vôi hòa với thuốc gốc Đồng quét lên thân cây cách mặt đất khoảng 1m vào đầu mùa mưa để ngừa nấm tấn công thân.

#### **Khi phát hiện cây nhiễm bệnh cần thực hiện những việc sau:**

Tiến hành thu gom và xử lý ngay những quả và cây bị nhiễm bệnh mang đi tiêu hủy để tránh nấm bệnh lây lan.

Sử dụng Bộ giải pháp phòng trừ nấm phun ướt đẫm thân, cành lá, quả để sát khuẩn, diệt nấm. Sau 3 ngày phun lại lần 2.

#### 4. [Thuốc trị bệnh thối quả sầu riêng](#)

THIBIPES giới thiệu đến nhà nông các loại thuốc trị thối quả sầu riêng hiệu quả nhất hiện nay:

### AMICOL 360EC



**Quy cách:** chai 240ml

#### **THÀNH PHẦN:**

Difenoconazole ... 155g/l

Propiconazole ..... 155g/l

Tebuconazole ..... 50g/l

#### **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

**CÂY TRỒNG**

**DỊCH HẠI**

**LIỀU LƯỢNG**

Lúa	Lem lép hạt.  Đốm vằn.	Pha 20ml/ bình 25 lít.
Chuối	Thán thư, tạo phần trái.	Pha 10-12ml/ bình 20 lít.
Mít	Sơ đen múi mít, thối quả.	Chai 240ml pha cho 2 phuy 200 lít. Liều lượng: 0,3-0,5 lít/ ha. Lượng nước 400-500 lít/ ha.
Cây ăn trái: Sầu Riêng, Xoài, Mãng Cầu.	Thán thư, khô đen bông, bóng đẹp trái.	Thời gian cách ly: 07 ngày.
Rau màu: Ớt, Cà Chua, Bắp Cải, Thán thư (đốm mắt cua). Dâu Tây, Hoa Hồng, ...		

## AMYLA TOP 325SC



**Quy cách:** chai 200ml, 240ml

**THÀNH PHẦN:**

Azoxystrobin ... 200g/l

Difenoconazole 125g/l

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

<b>CÂY TRỒNG</b>	<b>DỊCH HẠI</b>	<b>LIỀU LƯỢNG</b>
Lúa	Lem lép hạt Đốm vằn	Pha 15-20ml/ bình 25 lít. Liều lượng: 0,3-0,5 lít/ha.
Chuối	Thán thư, giữ bộ lá xanh tốt	Lượng nước: 400-500 lít/ha.
Mít	Sơ đen múi mít, thối quả	
Sầu Riêng	Thán thư bông, thối quả, khô bông	
Rau Mầu	Thán thư, chết cây con	
Xoài	Thán thư, phấn trắng	

Thời gian cách ly: 07 ngày.

**Amtivo 750WG**



**Quy cách:** gói 14g

### **THÀNH PHẦN:**

Tebuconazole .... 500g/kg

Trifloxystrobin ... 250g/kg

Phụ gia ..... 250g/kg

### **ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:**

- Là thuốc trừ bệnh phổ rộng công nghệ mới, nội hấp, lưu dẫn, trừ được nhiều loại bệnh xuất hiện cùng một lúc, ức chế quá trình sinh tổng hợp của các tế bào nấm bệnh. Thuốc đăng ký đặc trị hiệu quả bệnh đốm lá trên hồ tiêu.
- Được sản xuất bởi nhà máy tốt nhất trên thế giới về thuốc trừ bệnh. Với liều lượng tăng hơn 40% so với loại thông thường. Đã tốt nay còn tốt hơn; yên tâm tuyệt đối khỏi lo bệnh đạo ôn cổ bông, đạo ôn lá, đạo ôn cổ lá.
- Đặc trị: **đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn trên lúa.**

### **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

**CÂY TRỒNG**

**BỆNH HẠI**

**LIỀU LƯỢNG**

Lúa    Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn .                          14g/ bình 25 lít. Phun 2 bình cho 1.000m<sup>2</sup>.

Rau màu: Cà Chua, Ớt, Dưa Hấu, Bắp Cải, Hoa Cúc, Đậu Tây, Cây họ đậu, ...                          Rỉ sắt, thán thư, đốm lá, phấn trắng, đốm vòng, ...                          40g/ 100 lít nước, phun ướt đều tán lá cây.

Cây ăn quả: Xoài, Thanh Long, Sầu Riêng, Bưởi, Nho, Điều, Cam, Quýt, Vải, Mãng Cầu, ...                          Thán thư, cháy lá, đốm đen quả, rỉ sắt, đốm vòng, thối quả, ...                          80g/ 1 phuy 200 lít.                          Phun ướt đều tán lá cây.

- Thời gian cách ly an toàn: 07 ngày trước khi thu hoạch.

### **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.**

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHTT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com)

Web: [www.bvtvthienbinh.com](http://www.bvtvthienbinh.com)

Link Fanpage: <https://www.facebook.com/THIEN-BINH-102656208736169>

## **Thông tin liên quan**





—

[BỘ TRÍ GÂY HẠI SẼU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

**THIBIDES**<sup>®</sup>

Đồng hành cùng phát triển

# NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái



**LIÊN HỆ NGAY**



Email  
[info@bvtvthienbinh.com](mailto:info@bvtvthienbinh.com)



Hotline  
**0898.999.929**

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

**Bọ trĩ** **Muỗi hành**

**Rầy nâu** **Sâu đục thân**

**ĐẶC TRỊ!**

**Rầy phấn trắng**

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) Hotline: **0898.999.929**

**THIBIDES**  
Hàng hiệu công nghệ mới  
**TB DIETRAY**  
**NEW**  
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

**THAM SÂU LƯU ĐÃN,  
CHUYÊN VI MẠNH,  
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,  
KHÔ TRI ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**  
Địa chỉ: C22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hội, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929  
Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) - Website: [www.thienbinh.com](http://www.thienbinh.com)

**BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA**

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

**3** LOẠI BỆNH  
PHỔ BIẾN  
THƯỜNG GẶP  
**TRÊN ỚT CHUÔNG**

Liên hệ ngay



Website  
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline  
**0898.999.929**

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)