

Bọ cánh cứng - nỗi trăn trở của bà con trồng sầu riêng

Bọ cánh cứng hại sầu riêng khiến vườn cây bị khô đọt, héo lá, thủng lá và tạo điều kiện cho nấm khuẩn tấn công, hậu quả sẽ nghiêm trọng nếu không biết cách xử lý kịp thời.

1. Thời điểm xuất hiện

Ở các tỉnh phía Nam, bọ cánh cứng hầu như gây hại quanh năm, trong đó nặng nhất là các tháng mùa khô.

2. Các loại bọ cánh cứng hại sầu riêng: cấu cấu xanh, bọ ngâu (xanh, nâu, đen), xén tóc...

Bọ cánh cứng thường xuất hiện nhiều vào chiều tối và ban đêm, chúng bay thành từng đàn. Ban ngày chúng ẩn nấp trong tán cây rậm rạp hoặc dưới đất nên ít khi bị phát hiện. Khi rung động cành cây, bọ cánh cứng sẽ rơi xuống đất và nằm bất động.



Nguồn: internet



3. Đặc điểm gây hại và dấu hiệu nhận biết

- Đa số **bọ cánh cứng thuộc họ miệng nhai**, chúng ăn phần thịt của lá non, cắn gãy đọt non hoặc làm cụt đỉnh sinh trưởng của cây sầu riêng, làm cho cây suy kiệt, thiếu diện tích lá dẫn đến quang hợp kém, cây còi cọc, thậm chí là chết cây nếu ko phát hiện và tiêu diệt kịp thời.

- Thời điểm cây sầu riêng ra hoa, xỏ nhụy, mùi hương của hoa dẫn dụ **bọ cánh cứng** đến gây hại, làm thối hoa và rụng hoa, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thụ phấn và đậu trái sầu riêng.



Nguồn: internet

- Vết cắn của **bọ cánh cứng** tạo ra vết thương, tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào cây dễ dàng.

- Đa số bọ cánh cứng hoạt động vào ban đêm, ban ngày chúng trốn dưới đất nên chúng ta khó phát hiện. Những vườn bón phân hữu cơ chưa hoại mục thì tỷ lệ bị nhiều hơn.

4. Biện pháp phòng, trừ:

- Thăm vườn thường xuyên vào ban đêm để dễ dàng phát hiện.
- Bón phân hữu cơ hoại mục hoàn toàn.
- Khi vườn sầu riêng xuất hiện bọ cánh cứng gây hại, cần tỉa bỏ lá bị bệnh nặng và tiêu hủy
- Phun thuốc trừ sâu hiệu THIBIFOS 550EC để tiêu diệt thành trùng bọ cánh cứng.



Liều lượng: 450ml pha cho 2-3 phuy 220 lít nước.

- Rải gốc bằng thuốc trừ sâu hiệu THIBIGENT 4GR để diệt trứng, ấu trùng và nhộng của bọ cánh cứng. Liều lượng 18-20kg/ha.



Lưu ý: Vì bộ cánh cứng hoạt động vào ban đêm nên phun thuốc vào chiều tối cho hiệu quả diệt trừ tốt nhất.

Khi cây đang giai đoạn xo nõ nhụy không phun trực tiếp vào hoa, chỉ phun vài điểm trên lá để xua đuổi bộ cánh cứng.

Thường xuyên luân phiên đổi thuốc để hạn chế bộ cánh cứng kháng thuốc, các sản phẩm có thể thay thế như: THIBIFOS 550EC, TB RAYREP 330WP, TB DIETRAY NEW, ...

THUỐC TRỪ SÂU *caumangold 33wp*

Hệ
TB RAYREP 330WP

Hạt chất: acetamiprid 25% + imidacloprid 8%

Đặc trị: **RÂY XANH**
BỌ TRÍ, BỌ NHẢY



Khối lượng tịnh:
120 gr

NK & PP bởi: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: E22-D2, KDC Sò VHTT, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 02822 48 62 62 - Hotline: 0899 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.bvtvthienbinh.com



CÔNG DỤNG:

- Hiệu **TB RAYREP 330WP** là loại thuốc trừ sâu có tính lưu dẫn, chuyển vị mạnh trong cây.
- Thuốc được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, diệt trừ được hầu hết các loại rệp sáp, sâu đục thân, sâu đục trái, rầy xanh, rầy lưng trắng, rầy mềm, rệp muối, rầy nâu, bọ trĩ, bọ nhậy, bọ xít muỗi, ...
- Hiệu **TB RAYREP 330WP** được đăng ký trừ rầy nâu/ lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Lúa: 20gr/ bình 25 lít.
- Cây ăn trái, cây công nghiệp: 60gr/1 phuy 220 lít nước.
- Lượng nước phun: 400-500 lít/ ha.
- Phun khi mật độ sâu, rầy tuổi 1-2, khoảng 5-10 con/m².
- Thời gian cách ly: 14 ngày.

*** Hướng dẫn an toàn:**

Bảo quản thuốc nơi an toàn, xa tầm tay trẻ em. Không để chung với thực phẩm, thức ăn gia súc. Mang đồ bảo hộ lao động và không ăn uống, hút thuốc. Tắm rửa, thay quần áo ngay sau khi sử dụng thuốc. Không súc rửa dụng cụ phun xịt nơi ao hồ nuôi cá, nguồn nước sinh hoạt.

*** Điện pháp sơ cứu:**

Nếu thuốc dính vào da, rửa ngay bằng xà phòng. Nếu thuốc vàng vào mắt, giữ mắt mở rửa dưới vòi nước sạch trong 15 phút. Nếu hít phải thuốc, đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu nuốt phải thuốc, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, mang theo nhãn thuốc để sơ độc. Đối với bà mẹ: Điều trị theo triệu chứng.




ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Đơn vị đăng ký: Công ty TNHH TM Năng Phát
Địa chỉ: 387 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà sản xuất:
- Acetamiprid: Zhejiang Wellstone Chemical Co., Ltd.
Add: Chaoan, Yuhang, Hangzhou, Zhejiang, China.
- Imidacloprid: Jiangxi Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd.
Add: Sù Beijing Xi, Road, Nanchang, Jiangxi, China.
Số đăng ký: 297/CNĐKT-BVTV
NSX: Xem trên bao bì
HSD: 2 năm kể từ ngày SX

Hotline tư vấn:

0898 999 929





THIBIPES
THUỐC TRỪ SÂU Jangiro 25wp
CÂN THÂN
BẢO QUẢN XA TRẺ EM

**TB DIETRAY
NEW**

Hoạt chất: Dinotefuran ... 25%w/w

1
NUMBER

**THÂM SÂU, LƯU DẪN,
CHUYỂN VỊ MẠNH
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG
KHÓ TRỊ ĐÃ KHÁNG THUỐC**

Khối lượng tịnh:
120 gr


Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: E22-D2, KDC SỔ VHTT, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 02822.48.52.52 - Hotline: 0898.999.929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.bvtvthienbinh.com

CÔNG DỤNG:

- Hiệu **TB DIETRAY NEW** là loại thuốc trừ sâu có tính lưu dẫn, chuyển vị mạnh trong cây.
- Thuốc được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, diệt trừ được hầu hết các loại **rệp sáp, sâu đục thân, sâu đục trái, rầy xanh, rầy lưng trắng, rầy mềm, rệp muội, rầy nâu, bọ trĩ, bọ nhày, bọ xít muỗi, ...**
- Hiệu **TB DIETRAY NEW** được đăng ký trừ rầy nâu/lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Lúa:** 20gr/ bình 25 lit.
- **Cây ăn trái, cây công nghiệp:** 60gr/1 phuy 220 lit nước.
- Lượng nước phun: 400-500 lit/ ha.
- Phun khi mật độ sâu, rầy tuổi 1 -2, khoảng 5-10 con/m².
- Thời gian cách ly: 14 ngày.



*** Hướng dẫn an toàn:**
Bảo quản thuốc nơi an toàn, xa tầm tay trẻ em. Không để chung với thực phẩm, thức ăn gia súc. Mang đồ bảo hộ lao động và không ăn uống, hút thuốc. Tắm rửa, thay quần áo ngay sau khi sử dụng thuốc. Không súc rửa dụng cụ phun xịt nơi ao hồ nước cá, nguồn nước sinh hoạt.

*** Biện pháp sơ cứu:**
Nếu thuốc dính vào da, rửa ngay bằng xà phòng. Nếu thuốc văng vào mắt, giữ mắt mở rửa dưới vòi nước sạch trong 15 phút. Nếu hít phải thuốc, đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu nuốt phải thuốc, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, mang theo nhãn thuốc gây ngộ độc. Đối với bác sĩ: Điều trị theo triệu chứng.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Đơn vị đăng ký: Công ty TNHH TM SX GNC
Nhà sản xuất: Hebei Kaïming Pesticide Co., Ltd
Add: North of the East Section of Xindu East road, Jizhou City, P.R.C
Số đăng ký: 3671/CNDKT-BVTV
NSX: Xem trên bao bì
HSD: 2 năm kể từ NSX

Hotline tư vấn:
0898 999 929

Ngoài ra, vệ sinh vườn cho thông thoáng, tưới tiêu hợp lý, tránh để vườn khô hạn tạo điều kiện cho **bọ cánh cứng** phát sinh, phát triển và gây hại.

Chăm sóc, thường xuyên kiểm tra lá đọt để phát hiện sớm và phòng trừ.

Kính chúc quý bà con phòng trừ tốt đối tượng **BỌ CÁNH CỨNG** và được mùa trúng giá.

Nguồn: Admin tổng hợp.

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH

ĐC: E22-D2, KDC SỔ VHTT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐT: 02822.48.52.52

Web: www.bvtvthienbinh.com

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Tag: [Bọ cánh cứng sầu riêng](#), [bọ rùa hại bông sầu riêng](#), [sầu riêng](#), [bọ cánh cứng hại sầu riêng](#), [bọ canh](#)

[cung sau rieng](#), [bo canh cung hai sau rieng](#), [thuoc tri bo canh cung](#), [thuoc tri bo cánh cứng](#), [thuoc tri bo cánh cứng hại sầu rieng](#), [thuoc tri bo canh cung hai sau rieng](#)

Thông tin liên quan



BỘ TRÍ GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ



The infographic features a background of durian fruit and leaves. At the top left is the logo for THIBIPES with the tagline 'Đồng hành cùng phát triển'. The main title is 'NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA'. Below the title are four circular images showing different types of damage: a leaf with a hole, a stem with a hole, a stem with a large lesion, and a stem with a hole. To the left of these images is a list of four diseases, each with a green checkmark icon. At the bottom left is a 'LIÊN HỆ NGAY' button. At the bottom center are email and hotline contact details. At the bottom right is a cartoon chicken character.

THIBIPES
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY

Email: info@bvtvthienbinh.com

Hotline: 0898.999.929

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu công nghệ mới

TB DIETRAY
NEW

Hạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

NUMBER 1

**THÂM SÂU LƯU ĐÀN,
CHUYÊN VI MẠNH,
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,
KHÔ TRỊ ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: C22-02, KCC S3 VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.com

Khối lượng tịnh: 120g

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline
0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)