

Cách nhận biết và xử lý rầy nháy gây hại trên cây sầu riêng

Rầy nháy hay còn được biết đến là loại côn trùng lam hại trên cây sầu riêng. Nó phát triển rất nhanh và gây hại hầu như các giai đoạn của cây, nó tấn công mạnh nhất vào thời điểm mà cây ra những đợt non làm cháy lá và rụng lá non hàng loạt.

Allocaridara maleyensis (Chadila Unhawuti) là tên khoa học của **Rầy nháy**, nó thuộc họ Psyllidae, Bộ Homoptera. Thường thì nó xuất hiện nhiều và phổ biến nhất ở những vườn trồng sầu riêng ở các nước châu Á như Việt Nam, Thái Lan,...

1. Đặc điểm hình thái rầy nháy

Rầy nháy khi nó trưởng thành có kích thước khoảng từ 3-4mm, trong cơ thể nó có màu vàng nhạt, 2 cánh trong suốt.

Rầy non sẽ có 5 tuổi, tuổi 1 rầy có màu vàng và di chuyển chậm. Đến tuổi 2, trên cơ thể của nó bắt đầu phủ một lớp sáp màu trắng và có một ít lông tơ màu trắng ở phần cuối bụng của nó. Từ tuổi 3 trở đi thì cơ thể của nó sẽ có các sợi sáp trắng như bông gòn và rất dài ở cuối đuôi. Từ tuổi 2 đến tuổi 5 thì ấu trùng di chuyển rất nhanh và có khi bị động.

2. Đặc điểm sinh thái

Rầy khi đã trưởng thành thường sẽ sống tập trung mặt dưới các mặt lá, chúng đẻ trứng trong các mô lá non và tiếp tục sống tới 6 tháng. Rầy non hay ấu trùng tập trung nhiều trong các lá non xếp lại chưa mở ra.

Cả rầy trưởng thành và rầy non đều rất gây hại cho cây sầu riêng, rầy nháy chích hút nhựa của lá non, vì thế chúng thường có mật số rất cao trong các đợt cây, nhất là cây đang ra đợt non lá non. **Rầy nháy** di chuyển rất linh hoạt, một khi bị động chúng sẽ nhảy sang các lá khác.



[Rầy nhậy trên cây sầu riêng](#) - Lá sầu riêng bị **rầy nhậy** chích hút làm mép lá cháy xoắn

3. Biểu hiện gây hại

Lá sầu riêng khi bị rầy chích hút ban đầu xuất hiện những triệu chứng là chấm nhỏ màu vàng, sau đó mép lá sẽ bắt đầu bị cháy xoắn lại, khô dần dần và rụng, đôi khi là chỉ còn trơ lại những cành bị khô chĩa lên trời.

Những hiện tượng cháy khô lá và rụng khi bị **rầy nhậy** chích bạn rất dễ nhầm lẫn với các bệnh cây trồng khác như [bệnh thán thư](#), tác nắng hay nhiễm mặn.

Trong quá trình sinh sống của rầy nhậy, thì nó còn tiết ra những chất là môi trường rất tốt cho sự phát triển của nấm bồ hóng để phủ đen bề mặt lá ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình quang hợp của cây.



Đọt non sầu riêng bị rầy chích hút sẽ kém phát triển

4. Tác hại của rầy nháy

Cây trồng bị rầy nháy tấn công gây hại thường phát triển kém, lá nhỏ, cháy mép và rụng hàng loạt. Các đọt non cũng khô dần sẽ khiến cành trơ trọi.

Những vết thương do rầy nháy gây ra chích hút sẽ tạo điều kiện cho các loại nấm khuẩn xâm nhập và gây nên những bệnh đốm lá vi khuẩn,...

Nếu rầy gây hại trong thời kỳ ra hoa sẽ khiến hoa rụng, không thể đậu trái ảnh hưởng đến năng suất của mùa vụ



Ngon cây rụng lá trơ trọi


5. Cách xử lý rầy nhậy gây hại

Biện pháp xử lý:

Rầy nhậy tấn công từ khi lá còn chưa mở đến khi lá đã thành thực thì rầy không gây hại mạnh nữa. Do đó bà con cần cho phun từ khi cây xuất hiện mũi giáo (le lưỡi mè) đến khi lá cuối cùng trong cơi đọt mở ra và chuyển thành lá thành thực.

Đặc biệt giai đoạn này tính kháng của rầy xanh, bọ trĩ rất cao, cần luân phiên sử dụng thuốc.

*Giới thiệu đến bạn đọc sản phẩm thuốc bvtv trị rầy xanh hiệu quả cao: **TB DIETRAY NEW***



THIBIPES
THUỐC TRỪ SÂU *longpro 25wp*
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dinotefuran ... 25%w/w
Khối lượng tịnh: 120 gr

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: E22-D2, KDC SỞ VH TT, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 02822 48 52 52 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.bvtvthienbinh.com


**THẨM SÂU, LƯU DẪN,
CHUYỂN VỊ MẠNH
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG
KHỞI TRỊ ĐÀ KHÁNG THUỐC**

CÔNG DỤNG:

- Hiệu **TB DIETRAY NEW** là loại thuốc trừ sâu có tính lưu dẫn, chuyển vị mạnh trong cây.
- Thuốc được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, diệt trừ được hầu hết các loại **rệp sáp, sâu đục thân, sâu đục trái, rầy xanh, rầy lưng trắng, rầy mềm, rệp muội, rầy nâu, bọ trĩ, bọ nhảy, bọ xít muỗi, ...**
- Hiệu **TB DIETRAY NEW** được đăng ký trừ rầy nâu/lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Lúa:** 20gr/ bình 25 lít.
- **Cây ăn trái, cây công nghiệp:** 60gr/1 phuy 220 lít nước.
- Lượng nước phun: 400-500 lít/ ha.
- Phun khi mật độ sâu, rầy tuổi 1-2, khoảng 5-10 con/m².
- Thời gian cách ly: 14 ngày.



*** Hướng dẫn an toàn:**
Bảo quản thuốc nơi an toàn, xa tầm tay trẻ em. Không để chung với thực phẩm, thuốc an gia súc. Mang đồ bảo hộ lao động và không ăn uống, hút thuốc. Tắm rửa, thay quần áo ngay sau khi sử dụng thuốc. Không súc rửa dụng cụ phun xịt nơi ao hồ nuôi cá, nguồn nước sinh hoạt.

*** Biện pháp sơ cứu:**
Nếu thuốc dính vào da, rửa ngay bằng xà phòng. Nếu thuốc văng vào mắt, giữ mắt mở rửa dưới vòi nước sạch trong 15 phút. Nếu hít phải thuốc, đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu nuốt phải thuốc, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, mang theo nhãn thuốc gây ngộ độc. Đối với bác sĩ: Điều trị theo triệu chứng.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Đơn vị đăng ký: Công ty TNHH TM SX GNC
Nhà sản xuất: Hebei Kaiming Pesticide Co., Ltd
Add: North of the East Section of Xindu East road, Jizhou City, P.R.C
Số đăng ký: 3671/CNDKT-BVTV
NSX: Xem trên bao bì
HSD: 2 năm kể từ NSX

Hotline tư vấn: **0898 999 929**

Biện pháp canh tác:

Thường xuyên thăm, kiểm tra vườn để phát hiện sớm sự xuất hiện của rầy.

Chăm sóc cây trồng tốt, bón phân cân đối và hợp lý để cây ra đọt non đồng loạt, tránh ra lẻ tẻ tạo cơ hội cho rầy tấn công nhiều lần.

Cần bón đầy đủ dinh dưỡng giúp cây khỏe. Đồng thời tăng khả năng kích kháng cho cây để giúp cây chống lại sâu bệnh.

Ngoài ra nên tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loài **thiên địch** của **rầy nhảy** trong vườn như nhện, bọ rùa Coccinella, và ong ký sinh,...

Chúc bà con nông dân canh tác tốt - Trúng mùa - Được giá.

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.

- **ĐC: E22-D2, KDC SỞ VH TT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯƠNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.**

- **Web: bvtvthienbinh.com - ĐT: 02822.48.52.52**

Tag: [rầy bông sầu riêng](#), [Rầy nhảy sầu riêng](#), [rầy nhảy sầu riêng](#), [rầy nhảy trên cây sầu riêng](#), [rầy nhảy trên cây sầu riêng](#), [rầy xanh sầu riêng](#), [rầy xanh sầu riêng](#), [thuốc trị rầy nhảy sầu riêng](#), [thuốc trị rầy nhảy sầu riêng](#), [thuốc trị rầy xanh sầu riêng](#), [thuốc trị rầy xanh sầu riêng](#)

Thông tin liên quan



BỘ TRÍ GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ



THIBIPES
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY

Email: info@bvtvthienbinh.com

Hotline: 0898.999.929

The infographic features a background of durian fruit and leaves. It includes four circular images showing different types of damage: a leaf with necrotic spots, a stem with a hole, a stem with longitudinal cracks, and a fruit with a dark, sunken lesion. A cartoon chicken is positioned in the bottom right corner.

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng đầu Việt Nam
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

NUMBER 1

THÂM SÂU LƯU ĐÀN, CHUYÊN VI MẠNH, DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG, KHÔ TRỊ ĐÀ KHANG THUỐC

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: C22-02, KCC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.com

Khối lượng tịnh: 120g

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline
0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)