

# Sâu xanh da láng trên hành lá và thuốc đặc trị sâu xanh da láng trên hành lá hiệu quả hiện nay

Sâu xanh da láng là loài sâu đa thực, gây hại trên nhiều loại rau màu như rau ăn lá, đậu các loại, hành tỏi, ớt, cà chua, dưa hấu, nho... Đối với hành, sâu xanh da láng gây hại rất nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất. Do tập tính sâu sống trong ống hành và vào đến tối mới bò ra ngoài gây hại, sâu nhanh kháng thuốc nên việc phòng trị rất khó khăn. Cần phải áp dụng các biện pháp phòng trị phù hợp để hạn chế tác hại của loài sâu này.

## 1. Đặc điểm hình thái – sinh học của [sâu xanh da láng trên hành lá](#)


Sâu xanh da láng tên khoa học là *Spodoptera exigua*, Họ: Noctuidae, Bộ: Lepidoptera, có vòng đời từ 30 - 40 ngày.

Trưởng thành (5-7 ngày): là bướm màu nâu, có đốm vàng ở giữa cánh. Các cánh trước có màu xám và nâu lốm đốm; các cánh sau có màu xám hoặc trắng đồng đều hơn và có một đường đậm ở rìa. Bướm có kích thước vừa phải, sải cánh từ 25 - 30 mm, hoạt động mạnh về đêm.

Trứng (4-5 ngày): được đẻ thành từng ổ từ giữa lá đến ngọn lá hành, mỗi ổ từ 50-100 trứng, ổ trứng được phủ bởi một lớp vẩy trắng lọt bên ngoài. Một con trưởng thành có thể đẻ 3-4 ổ trứng/ lá.

Sâu non (16-21 ngày): có 5 tuổi. Sâu tuổi 1 sau khi nở chui vào bên trong ống hành ăn phần thịt lá, qua tuổi 2-3 chúng phân tán sang các lá xung quanh. Sâu non có màu xanh bóng giống màu lá hành, sâu lớn chuyển màu xanh vàng, nhẵn bóng, ít lông tơ, trên lưng có 5 sọc. Sâu non mới nở phá tập trung nhưng sau phân tán. Sâu phát triển qua 6 tuổi, sâu đầy sức dài 12-15 mm. Sâu hóa nhộng trong đất, chúng thường chui vào tàn dư hoặc lá khô để hoá nhộng.

Nhộng (5-7 ngày): nằm trong đất, có màu vàng nâu, cuối bụng có 2 gai nhỏ, phía trên lưng có 2 gai nhỏ khác.



## 2. Tập quán sinh sống và cách gây hại

Sâu xanh da láng thường phát triển và gây hại nặng trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn. Ban đêm sâu gây hại mạnh, còn ban ngày khi nắng nóng sâu thường chui xuống đất. Sâu gây hại bằng cách cạp nhu mô lá từ bên trong, làm lá mất chất diệp lục, giảm khả năng quang hợp làm bụi hành còi cọc. Sâu mới nở sống tập trung ăn các phần non của cây; sâu tuổi lớn ăn phá mạnh hơn, lá bị cạp thủng lỗ chỗ, gãy gập, đứt ngọn. Sâu thải phân bên trong ống hành.



Sâu hại trong và ngoài lá hành



Lá hành bị sâu gây hại

### 3. Biện pháp phòng trừ và [thuốc trị sâu xanh da láng trên hành](#)

#### **Biện pháp canh tác:**

Vệ sinh đồng ruộng, cày ải diệt sâu, nhộng. Trước khi trồng cần đưa nước vào ngập ruộng, hoặc sử dụng màng phủ nilon diệt nhộng trong đất.

Luân canh với các cây không phải ký chủ của sâu (lúa nước).

Chọn giống đã thu hoạch vụ trước từ ruộng ít bị sâu bệnh, sinh trưởng khỏe.

Không nên trồng với mật độ quá dày và thường xuyên tỉa lá gốc để cây thông thoáng.

Bắt sâu bằng tay vào sáng sớm hoặc chiều tối; ngắt bỏ các lá bị hại, các ổ trứng sâu đưa ra khỏi ruộng để tiêu hủy.

Nếu không phát hiện sớm và diệt trừ kịp thời, sâu sẽ tích lũy số lượng rất nhanh cắn phá rất mạnh, làm cho cọng hành bị khô héo, chết, xơ xác, cả bụi hành trở nên vàng úa, còi cọc, cả ruộng hành bị trắng xoá, tàn lụi.

**Thuốc đặc trị sâu xanh da láng trên hành lá hiệu quả hiện nay**

## **EMAGOLD 6.5EC**



**THÀNH PHẦN:**

Emamectin Benzoate 6.5% EC

Additive ..... 460g/ l

Solvent ..... 460g/ l

Viscosity ..... 400cps

**ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:**

- 

**Emagold 6.5EC** là thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới và mạnh nhất hiện nay. Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc nên dễ dàng tiêu diệt các loại sâu hại đã kháng thuốc.

- 

Thuốc trừ sâu **Emagold 6.5EC** được đăng ký trừ sâu khoang hại lạc. Ngoài ra hoạt chất Emamectin Benzoate được các công ty đăng ký trừ: **nhện gié, bọ trĩ, sâu đục thân,**

-

**sâu cuốn lá trên lúa, sâu tơ, sâu xanh, dòi đục lá, sâu đục quả, bọ xít muỗi, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh trên cây có múi, ...**

#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

<b>CÂY TRỒNG</b>	<b>SÂU HẠI</b>	<b>LIỀU DÙNG</b>
Lúa	Sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục thân, nhện gié.	15-20ml/bình 20 lít.
Rau màu: Bắp Cải, Cà Chua, Đậu Que, Hành, Tỏi, Dưa Leo, Dưa Hấu, Bầu, Bí, ...	Sâu tơ, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bọ trĩ, sâu xám, sâu xanh da láng, sâu đục quả, sâu đục thân.	15-20ml/bình 20 lít. Hoặc 240ml pha cho 1 phuy 200
Hoa Hồng, Hoa Cúc, Atiso, ...	Bọ trĩ, nhện đỏ, sâu vẽ bùa	
Cây ăn trái: Xoài, Bưởi, Cam, Quýt, Sầu Riêng, Mãng Cầu, ...	Bọ trĩ, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, sâu đục quả.	5 - 8ml/ bình 20 lít. Hoặc 80ml p 200 lít nước.

#### Chú ý:

- 

Nên phun thuốc vào sáng sớm hay chiều mát. Thuốc có thể được pha trộn với thuốc trừ sâu bệnh và các loại phân bón lá khác, trừ thuốc có tính kiềm.

- 

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc 6 ngày trước khi thu hoạch.

## Thông tin liên quan



[BỘ TRÍ GÂY HẠI SẼU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

**THIBIDES**<sup>®</sup>

Đồng hành cùng phát triển

# NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái



**LIÊN HỆ NGAY**



Email  
[info@bvtvthienbinh.com](mailto:info@bvtvthienbinh.com)



Hotline  
**0898.999.929**

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

**Bọ trĩ** **Muỗi hành**

**Rầy nâu** **Sâu đục thân**

**ĐẶC TRỊ!**

**Rầy phấn trắng**

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) Hotline: **0898.999.929**

**THIBIDES**  
Hàng hiệu công nghệ cao  
**TB DIETRAY**  
**NEW**  
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

**THAM SÂU LƯU ĐÃN,  
CHUYÊN VI MẠNH,  
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,  
KHÔ TRI ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**  
Địa chỉ: C22-02, KCC S3 VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hội, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929  
Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) - Website: [www.thienbinh.com](http://www.thienbinh.com)

**BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA**



THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

**3** LOẠI BỆNH  
PHỔ BIẾN  
THƯỜNG GẶP  
**TRÊN ỚT CHUÔNG**

Liên hệ ngay



Website  
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline  
**0898.999.929**

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)