

# Sâu xanh da láng và thuốc trị sâu xanh da láng hiệu quả

Tên khoa học: *Spodoptera exigua*

Họ Ngài Đêm: Noctuidae

Bộ Cánh Vảy: Lepidopera

Đặc điểm hình thái sâu xanh *Spodoptera exigua*

Hình dạng rất giống sâu xanh nhưng nhỏ con hơn (dài 10-15 mm), da xanh lục với 2 sọc vàng nâu chạy dọc 2 bên thân mình, không có u gai trên lưng như sâu xanh. Bướm nhỏ hơn, màu nâu và có 1 đốm vàng ở giữa cánh rất đặc sắc. Bướm cũng đẻ trứng ban đêm trên lá nhưng thành từng ổ từ 20-30 trứng có phủ lông trắng do chùm lông ở cuối bụng của con cái. Chu kỳ sinh trưởng của sâu ngắn hơn 1 tháng, ngắn hơn nhiều so với sâu xanh hay các loài sâu khác cùng họ Noctuidae. Có lẽ vì vậy mà sâu phát triển và gia tăng mật số rất nhanh, lây lan rất dễ vì chúng cũng ăn cả ớt, hành, cà chua, bắp... và kháng thuốc rất mạnh.

Tuổi 1: thân sâu có màu xanh lá cây hay vàng xanh, đầu đen bóng, mang nhiều lông, bụng màu vàng nhạt. Trên lưng có nhiều chấm to màu nâu nhạt, thời gian phát triển của sâu ở tuổi này từ 2 - 5 ngày.

Từ tuổi 2: Bụng màu vàng xanh, các đốm trên thân phân biệt rõ dần. Mình sâu có 3 sọc màu trắng mờ, một sọc giữa lưng và 2 sọc ở hai bên thân. Thời gian phát triển của sâu tuổi 2 từ 2-4 ngày.

Tuổi 3: có màu vàng xanh, sau chuyển sang màu xanh lá cây. Đầu màu vàng nhạt, bóng; vẫn còn mang nhiều lông. Thời gian phát triển của sâu ở tuổi này từ 2-3 ngày.

Từ tuổi 4 trở đi các vạch trên cơ thể sâu rõ dần, cơ thể có màu xanh nhạt dễ lẫn với màu của cọng tỏi.



## Đặc điểm sinh sống và gây hại của [sâu xanh da láng](#)

Ngài đẻ trứng thành từng ổ trên lá. Một ngài cái có thể đẻ 300 - 400 trứng.

Sâu non tuổi 1 tập trung gây hại xung quanh ổ trứng, đến cuối tuổi 1 sâu mới phát tán sang các lá khác. Khi lớn sâu phân tán dần. Sâu non tuổi 2 có tập quán nhả tơ bụng mình khi có động. Ở tuổi 3 sâu cắn phá mạnh nhất, có thể cắn thủng lá làm lá bị gục héo.

Sâu thường gây hại mạnh vào các tháng ít mưa hoặc ruộng khô hạn.

Sâu có đặc tính kháng thuốc nên rất khó phòng trị bằng thuốc hoá học.

Biện pháp phòng trị sâu xanh da láng *Spodoptera exigua*

Cũng áp dụng chiến lược tương tự như đối với sâu xanh



## Biện pháp canh tác, kỹ thuật

- + Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm ổ trứng và ngắt bỏ
- + Bắt sâu non bằng tay khi sâu còn nhỏ sống tập trung
- + Luân canh tỏi với lúa nước để diệt nhộng sâu trong đất
- + Cày ải diệt sâu, nhộng. Trồng mật độ thích hợp.
- + Vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch
- + Bảo vệ các loài thiên địch của sâu hại như: ong, ruồi ký sinh bằng cách hạn chế sử dụng thuốc hoá học hoặc chỉ dùng khi mật độ sâu quá cao.

Sử dụng các chế phẩm nấm (như nấm lục cương, nấm bạch cương);

Các loại chế phẩm này nên phun thuốc vào các buổi chiều mát.

[Thuốc trị sâu xanh da láng hiệu quả](#)

**EMAGOLD 6.5EC**



**THÀNH PHẦN:**

Emamectin Benzoate 6.5% EC

Additive ..... 460g/ l

Solvent ..... 460g/ l

Viscosity ..... 400cps

**ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:**

- 

**Emagold 6.5EC** là thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới và mạnh nhất hiện nay. Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc nên dễ dàng tiêu diệt các loại sâu hại đã kháng thuốc.

- 

Thuốc trừ sâu **Emagold 6.5EC** được đăng ký trừ sâu khoang hại lạc. Ngoài ra hoạt chất Emamectin Benzoate được các công ty đăng ký trừ: **nhện gié, bọ trĩ, sâu đục thân,**

-

**sâu cuốn lá trên lúa, sâu tơ, sâu xanh, dòi đục lá, sâu đục quả, bọ xít muỗi, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh trên cây có múi, ...**

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

<b>CÂY TRỒNG</b>	<b>SÂU HẠI</b>	<b>LIỀU DÙNG</b>
Lúa	Sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục thân, nhện gié.	15-20ml/bình 20 lít.
Rau màu: Bắp Cải, Cà Chua, Đậu Que, Hành, Tỏi, Dưa Leo, Dưa Hấu, Bầu, Bí, ...	Sâu tơ, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bọ trĩ, sâu xám, sâu xanh da láng, sâu đục quả, sâu đục thân.	15-20ml/bình 20 lít. Hoặc 240ml pha cho 1 phuy 200
Hoa Hồng, Hoa Cúc, Atiso, ...	Bọ trĩ, nhện đỏ, sâu vẽ bùa	
Cây ăn trái: Xoài, Bưởi, Cam, Quýt, Sầu Riêng, Mãng Cầu, ...	Bọ trĩ, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, sâu đục quả.	5 - 8ml/ bình 20 lít. Hoặc 80ml p 200 lít nước.

Chú ý:

•

Nên phun thuốc vào sáng sớm hay chiều mát. Thuốc có thể được pha trộn với thuốc trừ sâu bệnh và các loại phân bón lá khác, trừ thuốc có tính kiềm.

•

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc 6 ngày trước khi thu hoạch.

*Nguồn BVTV Thiên Bình tổng hợp*

**CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.**

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VH TT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com)

Web: [www.bvtvthienbinh.com](http://www.bvtvthienbinh.com)

Link Fanpage: <https://www.facebook.com/THIEN-BINH-102656208736169>

## Thông tin liên quan



[BỘ TRÍ GÂY HẠI SÀU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

# NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mũ
- ✓ Bệnh thối trái

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [info@bvtvthienbinh.com](mailto:info@bvtvthienbinh.com) Hotline: 0898.999.929

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

**Bọ trĩ** **Muỗi hành**

**Rầy nâu** **Sâu đục thân**

**ĐẶC TRỊ!**

**Rầy phấn trắng**

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) Hotline: **0898.999.929**

**THIBIDES**  
Hàng hiệu công nghệ mới

**TB DIETRAY**  
**NEW**

Hạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

NUMBER 1

**THÂM SÂU LƯU ĐÃN,  
CHUYÊN VI MẠNH,  
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,  
KHÔ TRỊ ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**  
Địa chỉ: C22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hội, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929  
Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) - Website: [www.thienbinh.com](http://www.thienbinh.com)

120g

**BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA**



THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

**3** LOẠI BỆNH  
PHỔ BIẾN  
THƯỜNG GẶP  
**TRÊN ỚT CHUÔNG**

Liên hệ ngay



Website  
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline  
**0898.999.929**

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)