

Thuốc trị rầy xanh trên sầu riêng thiên bình

Rầy xanh có Tên khoa học là Empoasca sp thuộc họ ve sầu nhảy Jassidae và có bộ cánh đều: Homoptera

Mỗi năm số lượng rầy phát sinh khoảng 10-14 lứa. Vòng đời vào khoảng 9-11 ngày vào mùa xuân, 7-8 ngày vào mùa hè, 14-16 ngày vào mùa đông.

Rầy xanh đẻ trứng ở mô mềm của búp chèn nhưng thường tập trung ở đọt nõn. Mỗi rầy cái trưởng thành có thể đẻ trung bình khoảng 30 trứng và tối đa có thể tới 150 trứng.

Tác hại của rầy xanh

Rầy xanh hút nhựa theo gân các lá nõn và làm lá xoắn lại để chuyển màu hơi vàng và các rìa lá bị cháy. Mật độ rầy cao cũng sẽ làm cháy lá và gây suy yếu không thể phát triển cây nữa. Đây cũng là một tác nhân gián tiếp lây truyền virus cho cây trồng.

>>**Xem thêm:** [Cách trừ rầy xanh gây hại sầu riêng một số điểm cần lưu ý](#)

- Rầy trưởng thành đẻ trứng rải rác vào mô nõn cọng búp và gân chính của lá sầu riêng. Một búp sầu riêng thường có từ 2 - 3 trứng, có khi 6 - 8 trứng.

- Rầy nõn thường ẩn náu mặt sau các lá búp. Từ tuổi 3 trở lên hoạt động nhanh nhẹn hơn có thể bò và nhảy. Khi bị khua động nhẹ có thể ven theo cuống cọng bò xuống dưới.

- Rầy nõn và rầy trưởng thành dùng vòi hút nhựa ở búp nõn theo đường gân chính và hai đường gân phụ của lá nõn, gây nên những vết chấm nhỏ như kim châm làm cho lá nõn bị tổn thương, việc vận chuyển nước và chất dinh dưỡng đến lá nõn bị trở ngại. Những lá này nếu gặp điều kiện khô nóng sẽ bị khô từ đầu lá và mép lá đến 1/2 lá. Phần còn lại trở nên cong queo cằn cỗi. Bị hại nhẹ lá có thể biến thành màu hồng.

- Mức độ phát sinh gây hại của **rầy xanh** tùy theo điều kiện sinh thái có khác nhau.

- Điều kiện thuận lợi cho rầy gây hại và sinh sôi nảy nở là lúc thời tiết chuyển từ lạnh sang nóng hoặc nắng mưa xen kẽ.

- Tác hại của rầy làm cho sản lượng và phẩm chất búp giảm nghiêm trọng.

Thuốc trị bệnh rầy xanh hiệu quả

Không trồng xen các loại cây ký chủ phụ của rầy xanh trong vườn sầu riêng.


Nguồn internet



Thời điểm phun
trừ rầy xanh

Phun các loại [thuốc diệt trừ rầy xanh](#) sau đây:

CT1: DIE SAURAY INDIA: 120gr/1 phuy 200lít nước.



Phun kỹ, ướt đều 2 mặt lá để đạt hiệu quả diệt trừ cao nhất.

Phun vào thời điểm đọt non(le lưỡi mèo), và phun lại lần 2 cách nhau 7 ngày.

Kính mời Quý Khách hàng liên hệ THIBIPES để được tư vấn chi tiết về những sản phẩm của Công ty.

Thông tin liên quan



[Sâu hại trên măng cầu](#)



[Bệnh lem lép hạt lúa](#)



[Bệnh Bọ trĩ Hoa hồng và cách khắc phục](#)



[Làm thế nào trị nhện đỏ cho mau khỏi bệnh](#)