

Tri rệp sáp trên cây sầu riêng có khó?

Rệp sáp là một trong những loại rệp phổ biến có thể làm chậm quá trình sinh trưởng, phát triển của cây sầu riêng, ảnh hưởng trực tiếp quá trình đậu quả, giảm năng suất.


Vậy đâu là cách nhận biết cây bị bệnh và cách phòng trừ rệp cụ thể? Hãy cùng THIBIPES tìm hiểu sâu hơn về [tri rệp sáp trên cây sầu riêng](#) để chăm sóc cây tốt hơn.

1. Đặc điểm hình thái:

- + Những cây sầu riêng bị nhiễm rệp thường có dấu hiệu rất rõ ràng là lá cây có những quả trứng nhỏ màu trắng hoặc nâu.
- + Trứng thường mọc thành từng chùm và sau một thời gian ngắn phát triển sẽ nở thành ấu trùng.
- + Hình thái của sâu non khi bám vào lá được bao phủ như một lớp sáp mỏng và có tua kéo dài xuống cuối thân lá.
- + **Rệp sáp gây hại** bằng cách bám vào cuống trái non hoặc rãnh giữa các gai trên trái để hút dịch vỏ sầu riêng.

2. Đặc tính sinh học và gây hại:

+ Trên sầu riêng có nhiều loại **rệp sáp**, chủ yếu xuất hiện và gây hại trên trái, bông, ít thấy trên lá. **Rệp sáp** cái có thân hình dài khoảng 3 mm, màu hồng hay vàng, bên ngoài phủ một lớp phấn bột trắng. Trứng được đẻ thành từng chùm 100 - 200 trứng, một con cái có thể đẻ 600 - 800 trứng. Sau 6 - 10 ngày, trứng nở ra rệp sáp con (crawler) màu vàng nhạt, trơn chưa phủ lớp bột trắng. Chúng nhanh chóng tìm nơi trú ẩn và gây hại. Rệp sáp đực nhỏ hơn con cái, lột xác 4 lần, có cánh, ngược lại rệp cái chỉ lột xác 3 lần, sau đó đẻ trứng và chết, rệp cái không có cánh. Rệp sáp tăng mật số rất nhanh, mỗi năm sinh sản 2 - 3 lần.+ Rệp sáp gây hại bằng cách hút nhựa nơi cuống trái non hoặc giữa các gai trên trái lớn. Khi trái còn nhỏ, nếu mật số rệp cao, trái bị biến dạng và rụng, nếu trái lớn, trái phát triển kém và bị sượng. Khi thiếu thức ăn, rệp trú ẩn dưới đất nơi vùng rễ.



Ngoài ra **rệp sáp** cũng gây hại rất mạnh trên hệ rễ sầu riêng: chúng là tác nhân gián tiếp mở đường để nấm khuẩn tuyến trùng gây hại hệ rễ sầu riêng. **Cây sầu riêng bị rệp sáp hại rễ** thường có triệu chứng sinh trưởng và phát triển rất kém, lá vàng úa từ gốc lên ngọn và rụng từ từ. Cây bị suy yếu, rễ bị thối, cây héo vàng dần, khi bị nặng lá rụng hàng loạt, quả nhỏ, hạt bị lép, cây khó hồi phục và nặng hơn có thể bị chết.



3. Cách phòng trừ rệp sáp trên cây sầu riêng

+Chăm sóc cây khỏe mạnh

+Tạo độ ẩm không quá thấp trong mùa khô duy trì một lớp rơm phủ hoặc là lớp cỏ phủ đất.

+ Kết hợp bón phân hữu cơ tươi nước đầy đủ cũng làm giảm **rệp sáp** xuất hiện trong mùa khô một cách đáng kể.

+Thường xuyên, cắt tỉa bỏ những cành bị sâu bệnh, cành nằm khuất trong tán lá không có khả năng cho trái... để vườn luôn thông thoáng.

+Duy trì một số loài thiên địch có sẵn trong thiên nhiên không chế được **rệp sáp** như Bọ rùa và Ong ký sinh để chúng ăn thịt những con rệp này.

Giới thiệu đến bà con sản phẩm trị rệp sáp hiệu quả:

AVENTO GOLD 200SC + TB DIETRAY NEW



THIBIPES
 THUỐC TRỪ SÂU *longpro 25wp*
TB DIETRAY
NEW
 Hoạt chất: Dinotefuran ... 25%w/w
 KHỐI LƯỢNG TÍNH: 120 gr

**THÂM SÂU, LƯU DẪN.
 CHUYỂN VỊ MẠNH
 DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG
 KHÓ TRỊ ĐÃ KHÁNG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
 Địa chỉ: E22-D2, KDC S3 VHTT, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM
 Điện thoại: 02822 48 52 52 - Hotline: 0898 999 929
 Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.bvtvthienbinh.com

CÂN THÂN
 BẢO QUẢN XA TRẺ EM

CÔNG DỤNG:

- Hiệu **TB DIETRAY NEW** là loại thuốc trừ sâu có tính lưu dẫn, chuyển vị mạnh trong cây.
- Thuốc được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, diệt trừ được hầu hết các loại **rệp sáp, sâu đục thân, sâu đục trái, rầy xanh, rầy lưng trắng, rầy mềm, rệp muội, rầy nâu, bọ trĩ, bọ nhày, bọ xít muỗi, ...**
- Hiệu **TB DIETRAY NEW** được đăng ký trừ rầy nâu/lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Lúa:** 20gr/ bình 25 lít.
- **Cây ăn trái, cây công nghiệp:** 60gr/1 phuy 220 lít nước.
- Lượng nước phun: 400-500 lít/ ha.
- Phun khi mật độ sâu, rầy tuổi 1-2, khoảng 5-10 con/m².
- Thời gian cách ly: 14 ngày.

*** Hướng dẫn an toàn:**
 Bảo quản thuốc nơi an toàn, xa tầm tay trẻ em. Không để chung với thực phẩm, thuốc an gia súc. Mang đồ bảo hộ lao động và không ăn uống, hút thuốc. Tắm rửa, thay quần áo ngay sau khi sử dụng thuốc. Không súc rửa dụng cụ phun xịt nơi ao hồ nuôi cá, nguồn nước sinh hoạt.

*** Biện pháp sơ cứu:**
 Nếu thuốc dính vào da, rửa ngay bằng xà phòng. Nếu thuốc văng vào mắt, giữ mắt mở rửa dưới vòi nước sạch trong 15 phút. Nếu hít phải thuốc, đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu nuốt phải thuốc, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, mang theo nhãn thuốc gây ngộ độc. Đối với bác sĩ: Điều trị theo triệu chứng.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Đơn vị đăng ký: Công ty TNHH TM SX GNC
 Nhà sản xuất: Hebei Kaiming Pesticide Co., Ltd
 Add: North of the East Section of Xindu East road, Jizhou City, P.R.C
 Số đăng ký: 3671/CNĐKT-BVTV
 NSX: Xem trên bao bì
 HSD: 2 năm kể từ NSX

Hotline tư vấn: **0898 999 929**

Rệp sáp gây hại rễ sầu riêng, bà con cần làm ẩm đất sau đó đổ hoặc rải thuốc trị rệp sáp vào gốc như (AMAGEN 8GR, Đồng thời sau đó bà con cần phục hồi hệ rễ kết hợp tưới vùng rễ sản phẩm TB SẠCH NĂM KHUẨN 250 WP, nhằm phòng ngừa bệnh vàng lá thối rễ).



Liên hệ ngay THIBIPES để được tư vấn sản phẩm và giải pháp đặc trị **rệp sáp** trên sầu riêng nhanh chóng và hiệu quả nhất!

Nguồn thông tin dịch hại: Admin tổng hợp

CÔNG TY TNHH THUỐC BTV THIÊN BÌNH

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHHT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯƠNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐT: 02822.48.52.52

Web: www.bvtvthienbinh.com

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Tag: [Rệp sáp trên cây sầu riêng](#), [sâu bệnh hại sầu riêng](#), [thuốc trị rầy sầu riêng](#), [rầy phấn trắng hại sầu riêng](#), [rầy phấn trên cây sầu riêng](#), [côn trùng hại sầu riêng](#), [bọ phấn trắng](#), [bọ phan trang](#), [rep sap tren cay sau rieng](#)

Thông tin liên quan



[BỘ TRƯỞNG GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

THIBIPEC[®]
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY

Email: info@bvtvthienbinh.com

Hotline: 0898.999.929

The advertisement features a background of durian fruit and leaves. It includes four circular inset images showing different types of plant damage: a leaf with necrotic spots, a stem with a hole, a stem with longitudinal cracks, and a durian fruit with a dark, sunken lesion. A cartoon chicken is positioned in the bottom right corner.

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu công nghệ mới

TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

**THAM SÂU LƯU ĐÃN,
CHUYÊN VI MẠNH,
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,
KHÔ TRI ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: C22-02, KCC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hội, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.com

120g

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline
0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)